

Omreken tabel opioïden (bron Pallialine 2016)

Morfine		Fentanyl	Oxycodon		Hydromorfon		Tramadol	Buprenorfine
oraal	s.c./i.v.	pleister	oraal	s.c./i.v.	oraal	s.c./i.v.	oraal	pleister
mg/24 uur	mg/24 uur	µg/uur	mg/24 uur	mg/24 uur	mg/24 uur	mg per 24 uur	mg/24 uur	µg/uur
30	10	12	20	10	6 <sup>2</sup>	2	150	-
60	20	25	40	20	12	4	300	-
120	40	50	80	40	24	8	- <sup>3</sup>	52,5
180	60	75	120	60	36	12	-	-
240	80	100	160	80	48	16	-	105
360	120	150	240	120	72	24	-	- <sup>4</sup>
480	160	200	320	160	96	32	-	-

Tabel 1 Omreken tabel opioïden<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bij het overgaan van het ene opioïd naar het andere (opioïdrotatie) vanwege bijwerkingen wordt geadviseerd om 75% van de equianalgetische dosis te geven

<sup>2</sup> Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagste dagdosering van het slow releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven

<sup>3</sup> Hogere doseringen dan 400 mg/dag worden niet geadviseerd

<sup>4</sup> Hogere doseringen dan 140 µg per uur worden niet geadviseerd